


Mieux vivre grâce au diagnostic précoce

Considérez les symptômes et signes d’une insuffisance cardiaque chez vos patients diabétiques.


Apprenez-en davantage

En l’absence d’un traitement adapté dans un délai d’une année, **le risque d’insuffisance cardiaque s’accroît de 63 % chez les patient-es diabétiques.** ¹

En cas de diabète de type 2, la probabilité d’insuffisance cardiaque ou d’autres maladies cardiovasculaires est particulièrement élevée.²



des patient-es atteints de diabète de type 2 développent une insuffisance cardiaque.³




des diabétiques de type 2 décèdent d’une insuffisance cardiaque dans les 5 ans.⁴

L’insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques est sous-diagnostiquée^{5,2}

Le diagnostic d’une insuffisance cardiaque au premier stade est laborieux, car les symptômes sont souvent faibles, transitoires ou non-spécifiques.⁶

Patient-es diabétiques > 60 ans⁵



44 %

avec une fonction ventriculaire gauche normale

25 %

avec une fonction cardiaque déjà réduite

27 %

avec une insuffisance cardiaque non-identifiée

4 %

avec une insuffisance cardiaque diagnostiquée

Souhaitez-vous en apprendre davantage sur l’utilisation du NT-proBNP au lieu de soins ?

Apprenez-en davantage



1. Paul SK, et al. Cardiovasc Diabetol 2015;14:100; In conjunction with HbA1c levels >7% (53 mmol/mol)

2. Seferovic PM et al: European Journal of Heart Failure (2018); 20, 853–872. doi:10.1002/ejhf.1170

3. American Diabetes Association. 10. Cardiovascular disease and risk management: standards of medical care in diabetes–2019. Diabetes Care. 2019;42(suppl 1):S103-S123.

4. Bertoni AG, Hundley WG, Massing MW, Bonds DE, Burke GL, Goff DC Jr. Heart failure prevalence, incidence, and mortality in the elderly with diabetes. Diabetes Care. 2004;27(3):699-703.

5. Boonman-de Winter LJM: Diabetologia (2012); 55(8):2154–2162

6. McMurray JJ et al: Eur J Heart Fail (2014); 16(7):817-25